

CAMPAGNE DE REPRODUCTION DES HUITRES PLATES 2017
BULLETIN N°25

TEMPERATURES, PECHES DE LARVES ET COLLECTEURS TEMOINS du 14 août 2017

Marée : coeff : 67//Pleine mer: 9h39 Vent : est 10 nœuds

	Heure	TEMPERATURES		PECHES DE LARVES			COLLECTEURS TEMOINS HEBDOMADAIRES	
		Fond	Surface	Nombre de larves /m ³	Larves évoluées		Nbre de naissains pour 30 coques de moules	Nbre de naissains /coupelle
					%	Nombre/ m ³		
MEN ER ROUE	10h00	17,6	17,6	100	5%	5	3	8
LE PO	10h30	17,6	17,6	225	5%	11	3	13
BEAUMER	11h15	17,7	17,8	1000	11%	110	2	22
PENTHIEVRE								15
CARNAC-POINTE CHURCHILL								22

ETAT DE LA MATURATION DES GENITEURS DU 14 août 2017

	Huîtres « Maigres »	Huîtres « Peu grasses »	Huîtres « Grasses »	Huîtres « Très grasses »	Huîtres « Laitieuses »	Huîtres « Ardoisées »
PENTHIEVRE*	56	26	6	6	2	4
MEN ER ROUE**	44	30	10	8	8	0

Observations:

La nouvelle maturation à Men Er Roué présumée la semaine dernière ne semble pas se confirmer. Les pourcentages d'huîtres « maigres » et « peu grasses » oscillent entre 74 et 82%. Ce dernier état de la maturation des géniteurs marque bien la fin de la saison de reproduction même si l'on observe encore 6 à 8 % d'huîtres « laiteuses » et « ardoisées ».

Les températures restent homogènes sur les 3 sites et dans la colonne d'eau. Elles passent en dessous de la normale saisonnière (graphiques 4 & 5).

Les concentrations en larves totales ont diminué depuis la semaine dernière tandis que les concentrations en larves évoluées restent stables (graphiques 6 à 8).

Les concentrations plus importantes en larves évoluées de la semaine dernière ont permis un captage légèrement plus important (graphiques 9 et 10).

Concentrations de larves de moules et anomies (en diminution) :

Moules : 25/m³ à Men Er Roué et 0/m³ au Pô et 0/m³ à Beaumer (graphique 11).


Anomies: 0/m³ à Men Er Roué, 0/m³ au Pô et 0/m³ à Beaumer.

Prochain bulletin : jeudi 10 août

Comparaison interannuelle de la maturation


(Graphique 1)

Depuis 1976 pour le banc du milieu
Depuis 2004 pour le banc de Penthièvre




Réalisation : Eureka modélisation/Ifremer

Comment lire ces graphiques :




Evolution de la maturation en 2017 sur les 2 bancs (Graphiques 2 et 3)

Penthièvre




Banc du milieu




Evolution de la température en 2017 à Men Er Roué (Graphiques 4 et 5)

Températures de surface à Men Er Roué





© Ifremer

Température de fond à Men Er Roué




© Ifremer


Evolution des concentrations larvaires sur les 3 sites (Graphiques 6 à 8)




Abondance de larves évoluées
Baie de Quiberon - 2017 -



Captage sur les 5 sites
Nombre de naissains fixés au cours d'une semaine
(Graphique 9)



Captage sur les 5 sites
Nombre de naissains fixés au cours de la saison
sur collecteurs hebdomadaires (coupelle chaulée)
 (Graphique 10)



Evolution des concentrations larvaires de MOULES sur les 3 sites
 (Graphique 11)

